



# Vinya

## Avís de tractament

**Terres dels Alforins:  
Moixent, La Font de la Figuera, Fontanars i Ontinyent**

### Cuc del raïm

*Lobesia botrana*



*Ou en cap negre*

La corba de vol d'adults de la 3a generació del cuc del raïm es va iniciar a principis d'agost en aquesta zona vitícola. Les primeres postes en rams van ser detectats el dia 5 d'agost en els paratges més primerencs de la zona. En les vinyes situades a Fontanars dels Alforins, s'observa un retard de 8-10 dies en el cicle biològic de la plaga.

Tant les captures d'adults en paranys com les postes observades en rams no són molt nombroses. No obstant això, es preveu que el cicle s'allargue pràcticament fins a la verema. A més, els nivells de plaga observats superen el llindar de tractament establert en la Guia de la Gestió Integrada de Plagues de Raïm de Transformació.

Des del Servei de Sanitat Vegetal es recomana fer un tractament insecticida per a controlar aquesta plaga.

Com a conseqüència de les diferències en el desenvolupament del cicle biològic de la plaga dins d'aquesta zona vitícola, es recomanen les següents dates de tractament:

- Moixent, La Font de la Figuera i Ontinyent: del 10 al 14 d'agost, tots dos inclusivament.
- Fontanars dels Alforins: del 17 al 21 d'agost, tots dos inclusivament.

Com a conseqüència de l'escalonament de vol i posta que s'observa en el cicle biològic de la plaga, en les varietats de recol·lecció tardana recomanem repetir el tractament passada la persistència de l'insecticida emprat.

### Podridura grisa

*Botrytis cinerea*

Per a evitar futurs atacs d'aquest fong i les temibles podridures, que minvaran la quantitat i, sobretot, la qualitat dels futurs vins, es recomana fer un tractament fungicida preventiu.

Aquest tractament sempre es realitzarà, com a mínim, 21 dies abans de la verema per a evitar possibles problemes en la fermentació dels mostos.

*Focus de podridura*





### **Recomanacions**

Per a un bon control d'aquests paràsits els recomanem utilitzar els volums de caldo adequats per a aconseguir un bon recobriment de tota la planta (especialment dels rams en el cas del cuc del raïm), així com la utilització de productes autoritzats i a la dosi que figure en l'etiqueta.

### **Productes**

Al Butlletí d'Avisos número 8, juny de 2019: <https://bit.ly/2XDG5tv>

### **A tindre en compte**

Davant els continus canvis en el Registre de Productes Fitosanitaris del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació quant a la desaparició del Registre o l'aparició de noves matèries actives autoritzades, es recomana consultar la pàgina web de l'esmentat Registre: <https://bit.ly/2DLGKUd>

Davant qualsevol dubte sobre el maneig dels plaguicides a utilitzar, contactar amb els tècnics encarregats de fer el seguiment d'aquests paràsits o amb el Servei de Sanitat Vegetal.

Silla (València), 7 d'agost de 2019



Web Sanitat Vegetal:

<http://www.agroambient.gva.es/va/web/agricultura/sanidad-vegetal>

Sanitat Vegetal en facebook: GVA Sanitat Vegetal

<https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/GVA-Sanitat-Vegetal-1612491505641246/>